

INFORMATION SUR LE DISPOSITIF CLINICAL SKIN LASER - EPILATION LASER

Indications d'utilisation

CLINICAL SKIN LASER est indiqué pour une application esthétique. Le système CLINICAL SKIN LASER est destiné à être utilisé sur tous les types de peau (types de peau Fitzpatrick I à V avec 785 nm ; IV à VI avec 1064 nm).

Le laser CLINICAL SKIN LASER est indiqué pour l'indication esthétique : Epilation.

Il est recommandé de consulter un professionnel de santé pour un examen diagnostique des zones de peau à traiter avant toute première séance d'épilation au laser. L'utilisateur vous équipera de coques de protection oculaire avant de commencer le traitement.

Contre-indications

Cancer de la peau, y compris le mélanome ou les lésions précancéreuses ; Parties de la peau présentant des zones enflées, rouges, irritées, infectées ou enflammées, des plaies ouvertes, des éruptions cutanées ; Toute affection dermatologique affectant la zone à traiter, y compris la dermatite, l'herpès simplex ; Coagulopathie ou prise d'anticoagulants ; Pathologies avec troubles de la cicatrisation (maladies du tissu conjonctif, troubles factices) ; Toute maladie grave, y compris les troubles endocriniens ou métaboliques ; Prise d'isotrétinoïne ou d'autres médicaments photosensibilisants dans les 3 mois précédant le traitement ; Application locale de cosmétiques à base de rétinol ou d'acide de fruits dans les 48 heures avant le traitement ; Traitement antibiotique systémique (pour toute indication) dans le mois précédent le traitement ; Prise de stéroïdes en cours (par exemple, prednisone, dexaméthasone), qui doivent être rigoureusement évités avant et pendant le traitement ; Photosensibilité connue ; Allergie connue aux anesthésiques locaux ; Présence de tatouages, maquillage permanent ou semi-permanent dans la zone traitée (limite de 2 cm) ; Présence d'un naevus (grain de beauté) dysplasique (délimitation de 2 cm) ; Taches pigmentaires comme des lentigo solaires ou encore taches de naissance sur la zone traitée (limite de 2 cm) ; Femme enceinte ou allaitante ; exposition à d'autres sources de lumière avant ou après le traitement au laser d'épilation ; Bronzage : Pas d'exposition au soleil ni cabine UV, 4 semaines avant et après le traitement; Consommateur âgé de moins de 18 ans.

Il est recommandé aux consommateurs de consulter leur médecin en cas de doute sur l'apparition d'une contre-indication lors d'une séance d'épilation au laser.

Complications et effets secondaires

Les effets secondaires les plus courants sont :

Erythème ; Œdème périfolliculaire ; Sensation de piqûre, de picotement ou de brûlure ; Pseudofolliculite

Les effets secondaires moins fréquents sont :

Brûlures, entraînant des croûtes et des cloques sur la zone traitée ; Trouble de la pigmentation : hypopigmentation ou hyperpigmentation ; Phototoxicité

Les effets secondaires rares sont :

Hypertrichose paradoxale ; Blessure oculaire ; Cicatrices ; Purpura ; Folliculite; Infection au site de traitement ; Douleur ; Irritation ou sécheresse de la peau ; Exacerbation transitoire de la pousse des poils

En cas d'effets secondaires indésirables, vous devez les signaler à l'exploitant, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ou via leur site internet.

Précautions

Avant traitement, il est important de prendre en compte que :

-Le rasage doit de préférence être effectué 48 heures avant. Les poils ne doivent être ni trop longs ni trop courts. Les poils ne doivent pas être décolorés ni épilés à la cire.

-La peau doit être nettoyée avant le traitement (le maquillage, les cosmétiques, le déodorant, les huiles essentielles doivent être retirés)

-Les gommages, peelings chimiques et mécaniques doivent être évités 7 jours avant et après le traitement au laser.

-Saunas et hammams doivent être évités 48 heures avant et après le traitement.

-La prise de corticoides oraux doit être rigoureusement évitée 48H avant et pendant toute la durée du traitement.

-L'utilisation de parfums, huiles essentielles, suppléments à base de plantes, parfums ou cosmétiques susceptibles d'affecter la sensibilité à la lumière (785 nm à 1064 nm) doit être évitée pendant 24 à 48 heures avant et après le traitement au laser.

-Il est conseillé d'éviter l'utilisation de crème anesthésiante lors d'une épilation au laser afin de ne pas sous-estimer les signaux de dommages potentiels.

-Protéger les tatouages avec une compresse et ne pas passer le laser à moins de 2 cm.

-Les patients présentant les conditions suivantes doivent être traités avec précaution et selon la discrétion de l'utilisateur :

•Avoir des antécédents de problèmes avec la thérapie au laser, doit être soigneusement examiné avant le traitement.

•Avoir un implant métallique tel que des épingles et des vis dans les zones traitées (limite de 5 cm)

•Équipement dentaire métallique sur les dents : protéger avec une compresse ou une gouttière

•Vitiligo

•Mélasma, taches de rousseur ou taches de naissance pigmentées : adapter les paramètres

•Herpès simplex : un traitement antiviral prophylactique peut être prescrit à la discrétion du médecin pour les patients présentant un herpès récurrent.